

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

Bebês e Crianças

Ao nascer	• BCG • Hepatite B	Dose única Dose
2 meses	• Pentavalente (DTP + Hib + HB) • Poliomielite inativada • Rotavírus humano oral • Pneumocócica 10	1ª Dose
3 meses	• Meningocócica C	1ª Dose
4 meses	• Pentavalente (DTP + Hib + HB) • Poliomielite inativada • Rotavírus humano oral • Pneumocócica 10	2ª Dose
5 meses	• Meningocócica C	2ª Dose
6 meses	• Pentavalente (DTP + Hib + HB) • Poliomielite inativada • Influenza • Covid-19 ¹	3ª Dose Essa vacina é oferecida anualmente
9 meses	• Febre Amarela	Dose
12 meses	• Tríplice Viral • Pneumocócica 10 • Meningocócica C	1ª Dose Reforço Reforço
15 meses	• Tríplice Bacteriana (DTP) • Poliomielite Inativada (VIP) • Tetra Viral ² • Hepatite A	1º reforço Reforço
4 anos	• Tríplice Bacteriana (DTP) • Varicela • Febre amarela	2º reforço 2ª Dose Reforço

Gestantes

• Hepatite B	Para gestantes em qualquer faixa etária e idade gestacional: administrar três doses da vacina, considerando o histórico de vacinação anterior. Nunca reiniciar esquema.
• dT (difteria e tétano) • dTpa (difteria, tétano e coqueluche) acelular	Esquema incompleto ou sem comprovação: administrar duas doses de dT e uma dose de dTpa a partir da 20ª semana até o puerpério imediato (45 dias), com intervalo de 60 dias entre as doses (mínimo de 30 dias). Importante: mesmo com esquema completo (três doses de dT) e o reforço de dT, a gestante deverá receber uma dose de dTpa a cada gestação.
• Influenza	Esta vacina é oferecida anualmente.

Crianças e Adolescentes

De 7 a 17 anos	• Hepatite B	Adolescente que não tiver comprovação de vacinação anterior, seguir o seguinte esquema: 2ª dose um mês após a 1ª dose; 3ª dose 5 meses após a 2ª dose. Se apresentar documentação com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado.
	• dT (difteria e tétano)	Adolescente sem comprovação vacinal: 3 doses com intervalo de 2 meses; Adolescente que já recebeu esquema completo, aplicar dose de reforço a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, antecipar a dose de reforço para 5 anos após a última dose; Adolescente que recebeu anteriormente uma ou duas doses: completar esquema.
	• Tríplice Viral	Adolescente sem comprovação vacinal: duas doses com intervalo de 30 dias. Adolescente que já recebeu anteriormente uma dose: completar o esquema. Adolescente que tiver duas doses da vacina tríplice viral (SCR) ou Tetra comprovadas no cartão de vacinação, não precisa receber essa dose.
	• Febre amarela	Sem comprovação ou que nunca foram vacinados: administrar dose única. Pessoas que receberam a 1ª dose antes dos 5 anos devem receber uma dose de reforço.
9 a 14 anos	• HPV (Papiloma Vírus Humano)	Dose única
	• Dengue	Esquema vacinal de 2 doses com intervalo de 3 meses
	• Meningo ACWY	Dose

Adultos e Idosos

A partir dos 18 anos	• dT (difteria e tétano)	Sem comprovação vacinal : 3 doses com intervalo de 2 meses entre cada dose. Se apresentar documentação de esquema incompleto, completar o esquema já iniciado. Adulto que já recebeu anteriormente três doses ou mais, aplicar uma dose de reforço a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, antecipar a dose de reforço para 5 anos após a última dose.
	• Febre amarela	Pessoas que receberam a 1ª dose antes dos 5 anos devem receber uma dose de reforço. Sem comprovação vacinal ou que nunca foram vacinados: administrar dose única até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Após os 60 anos, somente com atestado médico.
	• Tríplice Viral	Sem comprovação vacinal: administrar duas doses até 29 anos; dos 30 aos 59 anos administrar uma dose. Trabalhadores da saúde recebem duas doses conforme situação vacinal encontrada, independente da faixa etária.
	• Influenza	Essa vacina é oferecida anualmente.
	• Hepatite B	Sem comprovação vacinal, seguir o seguinte esquema: 2ª dose um mês após a 1ª dose; 3ª dose 5 meses após a 2ª dose. Se apresentar documentação com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado.

Atualização Janeiro/2025

1- O esquema vacinal contra Covid-19 está disponível a partir dos 6 meses até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Esquema de 2 ou 3 doses de acordo com o laboratório disponível

2- Quando a vacina Tetra Viral estiver indisponível, utilizar o esquema de substituição com Tríplice Viral (2ª dose) + Varicela (1ª dose)

