



EQUIPE DE  
IMUNIZAÇÕES

## Bebês e Crianças

Ao nascer	• BCG • Hepatite B	Dose única	Dose
<b>2 meses</b>	• Pentavalente (DTP + Hib + HB) • Poliomielite inativada • Rotavírus humano oral • Pneumocócica 10	1ª Dose	
<b>3 meses</b>	• Meningocócica C	1ª Dose	
<b>4 meses</b>	• Pentavalente (DTP + Hib + HB) • Poliomielite inativada • Rotavírus humano oral • Pneumocócica 10	2ª Dose	
<b>5 meses</b>	• Meningocócica C	2ª Dose	
<b>6 meses</b>	• Pentavalente (DTP + Hib + HB) • Poliomielite inativada  • Influenza  • Covid-19 <sup>1</sup>	3ª Dose  Essa vacina é oferecida anualmente	1ª Dose
<b>9 meses</b>	• Febre Amarela	Dose	
<b>12 meses</b>	• Tríplice Viral • Pneumocócica 10 • Meningocócica ACWY	1ª Dose Reforço Reforço	
<b>15 meses</b>	• Tríplice Bacteriana (DTP) • Poliomielite Inativada (VIP) • Tetra Viral <sup>2</sup> • Hepatite A	1º reforço  Reforço  Dose única Dose única	
<b>4 anos</b>	• Tríplice Bacteriana (DTP)  • Varicela  • Febre amarela	2º reforço  2ª Dose  Reforço	

## Gestantes

• Hepatite B	Para gestantes em qualquer faixa etária e idade gestacional: administrar três doses da vacina, considerando o histórico de vacinação anterior. Nunca reiniciar esquema.
• dT (difteria e tétano) • dTpa (difteria, tétano e coqueluche) acelular	Esquema incompleto ou sem comprovação: administrar duas doses de dT e uma dose de dTpa a partir da 20ª semana até o puerpério imediato (45 dias), com intervalo de 60 dias entre as doses (mínimo de 30 dias). Importante: mesmo com esquema completo (três doses de dT) e o reforço de dT, a gestante deverá receber uma dose de dTpa a cada gestação.
• VSR - Vírus Sincicial Respiratório	Aplicada em dose única, a cada gestação, a partir da 28ª semana, em qualquer faixa etária e sem limite de idade gestacional.
• Influenza	Esta vacina é oferecida anualmente.

1- O esquema vacinal contra Covid-19 está disponível a partir dos 6 meses até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Esquema de 2 ou 3 doses de acordo com o laboratório disponível  
2- Quando a vacina Tetra Viral estiver indisponível, utilizar o esquema de substituição com Tríplice Viral (2ª dose) + Varicela (1ª dose)

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

## Crianças e Adolescentes

<b>De 7 a 17 anos</b>	• Hepatite B  • dT (difteria e tétano)  • Tríplice Viral  • Febre amarela	Adolescente que não tiver comprovação de vacinação anterior, seguir o seguinte esquema: 2ª dose um mês após a 1ª dose; 3ª dose 5 meses após a 2ª dose. Se apresentar documentação com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado.  Adolescente sem comprovação vacinal: 3 doses com intervalo de 2 meses; Adolescente que já recebeu esquema completo, aplicar dose de reforço a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, antecipar a dose de reforço para 5 anos após a última dose; Adolescente que recebeu anteriormente uma ou duas doses: completar esquema.  Adolescente sem comprovação vacinal: duas doses com intervalo de 30 dias. Adolescente que já recebeu anteriormente uma dose: completar o esquema. Adolescente que tiver duas doses da vacina tríplice viral (SCR) ou Tetra comprovadas no cartão de vacinação, não precisa receber essa dose.  Sem comprovação ou que nunca foram vacinados: administrar dose única. Pessoas que receberam a 1ª dose antes dos 5 anos devem receber uma dose de reforço.
<b>9 a 14 anos</b>	• HPV (Papiloma Vírus Humano)	Dose única
<b>10 a 14 anos</b>	• Dengue	Dose única ou esquema de 2 doses com intervalo de 3 meses, de acordo com o laboratório.
<b>11 a 14 anos</b>	• Meningo ACWY	Dose ou reforço

## Adultos e Idosos

<b>A partir dos 18 anos</b>	• dT (difteria e tétano)  • Febre amarela  • Tríplice Viral  • Influenza  • Hepatite B	Sem comprovação vacinal : 3 doses com intervalo de 2 meses entre cada dose. Se apresentar documentação de esquema incompleto, completar o esquema já iniciado. Adulto que já recebeu anteriormente três doses ou mais, aplicar uma dose de reforço a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, antecipar a dose de reforço para 5 anos após a última dose.  Pessoas que receberam a 1ª dose antes dos 5 anos devem receber uma dose de reforço. Sem comprovação vacinal ou que nunca foram vacinados: administrar dose única até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Após os 60 anos, somente com atestado médico.  Sem comprovação vacinal: administrar duas doses até 29 anos; dos 30 aos 59 anos administrar uma dose. Trabalhadores da saúde recebem duas doses conforme situação vacinal encontrada, independente da faixa etária.  Essa vacina é oferecida anualmente.  Sem comprovação vacinal, seguir o seguinte esquema: 2ª dose um mês após a 1ª dose; 3ª dose 5 meses após a 2ª dose. Se apresentar documentação com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado.
-----------------------------	--	--

Atualização Janeiro/2026



Prefeitura de  
Porto Alegre  
SECRETARIA DE SAÚDE