
Estratégia de Vacinação contra Covid-19

Abril, 2025

Vacinas em Uso

- **Vacina covid-19-RNA, Moderna (Spikevax), Ômicron XBB 1.5/JN1:**

Contém RNA mensageiro (RNA) de cadeia simples, que codifica a proteína S (spike) do vírus SARSCoV-2.

- **Vacina covid-19-RNA, Pfizer (Comirnaty), Ômicron XBB 1.5:**


Composta de RNA mensageiro (RNA) de cadeia simples, envolvido em nanopartículas lipídicas, codificando a proteína S (spike) do SARS-CoV-2.

- **Vacina covid-19-recombinante, Serum/Zalika, Ômicron XBB 1.5:**

Contém proteína S (spike) do SARS-CoV-2 associada ao adjuvante Matrix-M produzida por tecnologia de DNA recombinante.

Vacinação Estratégia Rotina

- ❖ Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade;
- ❖ Pessoas de 60 anos ou mais de idade;
- ❖ Gestantes.




Esquema Vacinal para Crianças

Toda a população entre **6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias** não vacinada ou com esquema vacinal incompleto, de acordo com a faixa etária, para vacinação de rotina no Calendário Nacional de Vacinação Infantil.

Meta para cobertura vacinal: 90%

Esquema Vacinal para Crianças - Moderna




Crianças não vacinadas deverão receber duas doses da vacina Covid-19-RNA, Moderna (Spikevax) com intervalo de 4 semanas. O esquema primário deverá ser com o mesmo imunizante;

Crianças com esquema incompleto de vacinas covid-19 originais (vacinas CoronaVac ou Pfizer) deverão completar o esquema com a vacina disponível;

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias **imunocomprometidas que nunca se vacinaram** deverão receber o esquema primário de três doses da vacina Covid-19-RNA, Moderna. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas;

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade **com comorbidades** que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber uma dose anual da vacina atualizada.

Esquema Vacinal para Crianças - Moderna



Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade **imunocomprometidas** que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber duas doses da vacina atualizada, com intervalo mínimo de seis meses entre as doses.

Idade(s)	Dose	Intervalo entre as doses
Crianças de 6 meses a 4 anos de idade, SEM VACINAÇÃO PRÉVIA.	Duas doses de 0,25 mL cada, administradas por via intramuscular.*	Administrar a segunda dose quatro semanas após a primeira dose.

Fonte: modificado de Anvisa. <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2024/anvisa-aprova-registro-da-vacina-spikevax-monovalente>.

*Não utilizar o frasco-ampola de dose única para administrar um volume parcial de 0,25 mL.

Esquema Vacinal para Crianças - Pfizer XBB



Crianças não vacinadas deverão receber três doses da vacina Covid-19-RNA, Pfizer, com intervalo de 4 semanas entre a primeira e segunda dose e 8 semanas entre a segunda para a terceira dose. O esquema primário deverá ser com o mesmo imunizante;

Crianças com esquema incompleto de vacinas covid-19 originais (vacinas CoronaVac ou Pfizer) deverão completar o esquema com a vacina disponível;

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias **imunocomprometidas que nunca se vacinaram** deverão receber o esquema primário de três doses da vacina Covid-19-RNA, Pfizer. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas;

Esquema Vacinal para Crianças - Pfizer XBB




Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade **com comorbidades** que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber uma dose anual da vacina atualizada;

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade **imunocomprometidas que receberam** o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber duas doses da vacina atualizada, com intervalo mínimo de seis meses entre as doses.

Idade(s)	Dose	Intervalo entre as doses
Crianças de 6 meses a 4 anos de idade, SEM VACINAÇÃO PRÉVIA.	Três doses de 0,2 mL cada, administradas por via intramuscular.	Administrar a segunda dose quatro semanas após a primeira dose. Administrar a terceira dose oito semanas após a segunda dose.

Fonte: adaptado das informações presentes na bula da vacina Comirnaty®, Pfizer:
https://www.pfizer.com.br/files/Comirnaty_Profissional_de_Saude_69.pdf

Crianças entre 6
meses e 4 anos,
11 meses e 29
dias

Formulação	6 meses a 4 anos (ou seja, 6 meses a menos de 5 anos de idade), diluir para usar
Frasco	Frasco multidose
Cor da tampa do frasco	 Vinho
Dosagem	3 mcg
Doses por frasco	10 doses por frasco (após a diluição)
Diluição	Diluição necessária
Volume (antes da diluição)	0,4 ml
Quantidade de diluente necessária por frasco	2,2 ml
Volume de aplicação por dose (pós diluição)	0,2 ml
Tempo de armazenamento em freezer de Ultra Baixa Temperatura - ULTF (de -90 °C a -60 °C)	18 meses (prazo de validade)
Tempo de armazenamento em freezer (de -25 °C a -15 °C)	NÃO ARMAZENAR
Tempo de armazenamento em refrigerador (de 2 °C a 8 °C)	10 semanas
Após a primeira aplicação ou diluição (de 2 °C a 25 °C)	Descartar 12 horas após a diluição
Tamanho da embalagem	10 frascos

Pfizer Ped - Crianças 5 a 11 anos

Pfizer Ped - Tampa Azul



Apresentação: DU ou frasco com 06 doses;

NÃO DILUIR;

Via de administração: Intramuscular;

Dose: 0,3 mL;

Validade após o descongelamento: 10 semanas
(validade corrigida estará na nota);

O tempo de **validade após abertura do frasco**: 12 horas.

Pfizer Ped - Tampa Laranja



Apresentação: frasco 10 doses;

Necessita de diluição em volume de 1,3mL;

Via de administração: Intramuscular;

Dose: 0,2 mL;

Validade após o descongelamento: 10 semanas
(validade corrigida na nota);

O tempo de validade **após abertura do frasco**: 12 horas.

Acima de 12 anos



Pfizer XBB 12 ou + - Tampa Cinza

Apresentação: frasco 06 doses;

NÃO DILUIR;

Via de administração: Intramuscular;

Dose: 0,3 mL;

Validade após o descongelamento: 10 semanas (validade corrigida na nota);

O tempo de **validade após abertura do frasco**: 12 horas.

Acima de 12 anos

Vacina recombinante Serum/Zalika, Ômicron XBB 1.5

Apresentação em frasco-ampola com 5 doses;

NÃO DILUIR;

Via de administração: Intramuscular;

Dose: 0,5 mL;

Considerar a validade de fabricação descrito na nota de fornecimento, pois não é ultracongelada;

O tempo de validade após abertura do frasco: 12 horas.



Laboratório Moderna - Frascos Multidose

Poderá ser utilizado para o público a partir dos 6 meses, **de acordo com as orientações do MS.**

Vacina Covid-19-RNA,
Moderna (Spikevax)

1.2214.0131



Volume da dose:

0,25 mL 6 meses a 11 anos, 11 meses e 29 dias;

0,5 mL a partir de 12 anos;

Pronta para uso. Não diluir!

Duração de 30 dias após o descongelamento;

Validade de 19 horas após abertura do frasco.

Atenção!!!!



- Os esquemas primários deverão ser feitos priorizando o uso do mesmo imunizante do início de esquema (esquemas homólogos).
- Crianças de **6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias** de idade que **não completaram o esquema primário** dentro desse período, ao completarem 5 anos de idade serão considerados vacinados e terão seu esquema encerrado se tiver pelo menos uma dose.

Esquema Vacinal para Idosos

Será considerada toda a população a partir de 60 anos de idade, de acordo com a faixa etária, para vacinação de rotina no Calendário Nacional de Vacinação do Idoso.

Meta para a cobertura vacinal: 90%

Para a população a partir de 60 anos de idade estão disponíveis três vacinas contra a covid-19:

- 1) vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)
- 2) vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty)
- 3) vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika.

Para a população a partir de 60 anos de idade a recomendação é o recebimento de **uma dose a cada seis meses**, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas.

Esquema Vacinal para Gestantes

Serão consideradas todas as gestantes, de acordo com a faixa etária, para vacinação de rotina no Calendário Nacional de Vacinação da Gestante.

Meta para cobertura vacinal: 90%

A vacinação contra a covid-19 durante a gravidez tem sido recomendada amplamente para prevenir doença grave e mortes nesta população.

Para as gestantes não haverá exigência quanto à comprovação da situação gestacional, sendo suficiente para a vacinação que a própria mulher relate sua gravidez.

Esquema Vacinal para Gestantes

Para **gestantes com idade inferior a 12 anos** estão disponíveis duas vacinas contra a covid-19:

- 1) vacina Covid-19-RNA, Moderna (Spikevax)
- 2) vacina Covid-19-RNA, Pfizer (Comirnaty).

Para **gestantes com idade a partir de 12 anos** estão disponíveis três vacinas contra a covid-19:

- 1) vacina Covid-19-RNA, Moderna (Spikevax)
- 2) vacina Covid-19-RNA, Pfizer (Comirnaty)
- 3) vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika.

Para as gestantes a recomendação é o **recebimento de uma dose em qualquer momento da gestação e em cada gestação**, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas.

Vacinação de Grupos Especiais

São considerados para vacinação especial contra a covid-19 pessoas com 5 anos de idade ou mais e com maior vulnerabilidade:

Ex.: acesso insuficiente ao serviço de saúde) ou condição que aumenta o risco para as formas graves da doença.

Por isso, essas populações têm indicação de dose anual ou a cada seis meses, dependendo do grupo, independentemente do número de doses prévias de vacinas covid-19.



Para as doses periódicas, o intervalo mínimo entre a dose da vacina disponível e qualquer dose prévia de vacina covid-19 é de seis meses.

Vacinação de Grupos Especiais

Dose Anual (Exceto Imunodeprimidos)

Grupos para vacinação especial
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência
Pessoas imunocomprometidas
Indígenas vivendo em terra indígena
Indígenas vivendo fora da terra indígena
Ribeirinhos
Quilombolas
Puérperas
Trabalhadores da saúde
Pessoas com deficiência permanente
Pessoas com comorbidades
Pessoas privadas de liberdade
Funcionários do sistema de privação de liberdade
Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas
Pessoas em situação de rua

Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Trabalhadores dos correios (NOTA TÉCNICA No 20/2025-DPNI/SVSA/MS)

Doença respiratória crônica
Doença cardíaca crônica
Doença renal crônica
Doença hepática crônica
Doença neurológica crônica
Diabetes
Imunossupressão
Obesidade grave (IMC≥40)
Transplantados
Portadores de trissomias

Vacinação de Grupos Especiais

PESSOAS DOS GRUPOS ESPECIAIS DE 5 a 11 ANOS DE IDADE:

Pessoas dos grupos especiais, exceto imunocomprometidos, independentemente do recebimento ou não de doses prévias de qualquer vacina covid-19, deverão receber **UMA DOSE** da vacina Covid-19-RNA, Pfizer, ou da vacina Covid-19-RNA, Moderna, com o volume da dose e a formulação recomendadas para a idade.

PESSOAS DOS GRUPOS ESPECIAIS A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE:

Pessoas dos grupos especiais, exceto imunocomprometidos, independentemente do recebimento ou não de doses prévias de qualquer vacina covid-19, deverão receber **UMA DOSE** da vacina Covid-19-RNA, Pfizer, ou da vacina Covid-19-RNA, Moderna, ou da vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika.

Vacinação de Grupos Especiais



Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade, que não pertencem a algum grupo prioritário, que **não completaram o esquema primário dentro desse período**, ao completarem 5 anos de idade serão considerados vacinados e terão seu esquema encerrado se tiver pelo menos uma dose.

Gestantes, pessoas com deficiência, indígenas e povos tradicionais (quilombolas e ribeirinhos) não necessitam de comprovação.

Imunocomprometidos

Definição de indivíduos imunocomprometidos ou em condição de imunossupressão

Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea.

Pessoas vivendo com HIV (PVHIV).

Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias.

Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, ≥ 2 mg/kg/dia por mais de 14 dias até 10 kg.

Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão.

Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias).

Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise ou outras terapias substitutivas.

Pacientes oncológicos que realizam ou realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico e estão em acompanhamento.

Pessoas com neoplasias hematológicas.

Fonte: elaborado com base no *Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais*. 6ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

Imunocomprometidos

Pessoas com idade entre 5 e 11 anos de idade, imunocomprometidas, que nunca se vacinaram deverão receber o esquema primário de TRÊS DOSES da vacina Covid-19-RNA_m, Pfizer ou da vacina Covid-19-RNA_m, Moderna. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas.

Pessoas a partir de 12 anos de idade, adolescentes e adultos imunocomprometidos que nunca se vacinaram deverão receber o esquema primário de TRÊS DOSES da vacina Covid-19-RNA_m, Pfizer, ou da vacina Covid-19-RNA_m, Moderna, ou da vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas.

Imunocomprometidos

Pessoas imunocomprometidas que estão com o **esquema de vacinação incompleto** deverão **completar o esquema de TRÊS DOSES** com o imunizante disponível e a dose para a idade. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas.

Pessoas imunocomprometidas que estão com o **esquema de vacinação completo** deverão receber **DUAS DOSES de vacinas covid-19 com intervalo de seis meses entre as doses.**

Transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH)

O transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) é um procedimento terapêutico com o objetivo de reconstruir o órgão hematopoiético. Estudos têm demonstrado que os transplantados de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) perdem a imunidade protetora no pós-transplante. Esses indivíduos devem ter seu esquema vacinal refeito **(OUTROS IMUNOS)**.

Vacina	Esquema primário	Intervalo mínimo	Registro nos sistemas de informação
Vacina covid-19 disponível e recomendada para a faixa etária	D1, D2 e D3	Quatro semanas após a D1 e oito semanas após a D2	1ª dose revacinação (D1 REV) 2ª dose revacinação (D2 REV) 3ª dose revacinação (D3 REV)

Intercambialidade

A continuidade do esquema vacinal pode ser feita com vacinas covid-19 de fabricantes diferentes (esquema heterólogo) nas seguintes situações:

- indisponibilidade ou descontinuidade da vacina utilizada inicialmente;
- contra-indicação da vacina covid-19 utilizada em dose anterior.

Intercambialidade

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se uma dose da Pfizer pediátrica	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 2ª-dose (D2)	D1 para D2: quatro semanas	Modelo informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 3ª dose (D3)		
	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	D2 para D3: oito semanas	
	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)		
Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se duas doses da Pfizer pediátrica	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	D1 para D2: quatro semanas	Modelo informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 3ª dose (D3)	D2 para D3: oito semanas	

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se uma dose da CoronaVac	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 2ª dose (D2)	D1 para D2: quatro semanas D2 para D3: oito semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)		
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)		
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)		

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3		Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se duas doses da CoronaVac	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)		D1 para D2: 4 semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: Rotina
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)		D2 para D3: 8 semanas	

Intercambialidade

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se uma dose da Moderna	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 2ª dose (D2)	-	D1 para D2: quatro semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	D1 para D2: quatro semanas	
	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 2ª dose (D2)	D2 para D3: oito semanas	

Especificidades das Vacinas

Especificações de segurança	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika
Apresentação	Frasco-ampola multidose, tampa cinza; tampa azul (vacina diluída); tampa laranja (vacina não diluída); tampa vinho.	Frasco-ampola multidose.	Frasco-ampola multidose.
Prazo de validade e temperatura de conservação após aberto	Após aberto, válido por 12 horas entre 2°C e 25°C.	Frasco-ampola multidose: 19 horas após aberto entre 2°C e 25°C.	Pode ser utilizada em até 12 horas após abertura, desde que mantida em condições assépticas e sob temperatura de 2°C a 8°C, ou seis horas à temperatura máxima de 25°C.

Fontes: bula da vacina Covid-19, Pfizer, Comirnaty®; bula da vacina Covid-19-RNAm, Spikevax; bula da vacina Covid-19 (recombinante), Serum/Zalika.

Especificidades das Vacinas



6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias



5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias



A partir de 12 anos

Evento Supostamente Atribuíveis à Vacinação e Imunização



Casos graves, inusitados e raros

Especificações de segurança	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika
Considerações gerais	Plataforma não replicante e não integradora		
Manifestações locais	Dor local, vermelhidão e edema.	Dor local, vermelhidão, edema e linfadenopatia leves e moderados. Mais intensos na segunda dose.	Dor local, fadiga, dor de cabeça, mialgia, calafrios e artralgia.
Manifestações sistêmicas	Fadiga, cefaleia, mialgia, artralgia, tremores, diarreia, febre, náuseas e vômitos.	Fadiga, sonolência, perda de apetite, cefaleia, mialgia e calafrios. Mais intensos na segunda dose.	Reações relacionadas à ansiedade, incluindo reações vasovagais (síncope), hiperventilação ou reações relacionadas ao estresse associado à vacinação como uma resposta psicogênica à injeção com agulha.

Precauções e Contraindicações

Pessoa com histórico de reações alérgicas;

Pessoa com histórico de trombocitopenia e perturbações da coagulação;

Pessoa com infecção pelo SARS-CoV-2;

Pessoa com outra infecção aguda;

Miocardite/pericardite;

Reações associadas à ansiedade;

Exacerbações da síndrome de transudação capilar (STC).

Doação de Sangue

Para doação de sangue: de acordo com a Anvisa, os candidatos elegíveis à doação de sangue que tiverem sido vacinados contra a covid-19 devem ser considerados inaptos pelo período de sete dias após a vacinação se as vacinas forem RNAm ou vetor viral.

Administração Simultânea

As vacinas covid-19 podem ser administradas simultaneamente ou a qualquer momento antes ou depois de outras vacinas para adultos, adolescentes e crianças, incluindo vacinas atenuadas e inativadas, excetuando-se a vacina contra a dengue (24 horas).

Registros

O registro deve ser realizado como **ROTINA**:

- crianças (D1, D2 e D3)
- gestantes e idosos - Dose

E como **ESPECIAL** para os grupos prioritários - DOSE


Os grupos especiais devem possuir prioridade para a digitação. Ex: uma gestante indígena deverá ser registrada como estratégia ESPECIAL - grupo: indígena.

Movimentação

A movimentação de imunobiológicos na sala de vacina – entrada e saída – será feita no módulo exclusivo do Novo SI-PNI;

Deverá ser atualizada toda vez que houver recebimento de vacina ou quando houver saída pelos seguintes motivos: utilização (no de doses por frasco aberto), transferência de doses, quebra do frasco, falta de energia elétrica, falha de equipamento, validade vencida, procedimento inadequado, falha de transporte e indisponibilidade visando controlar os estoques no município e no estabelecimento de saúde.

Referências



Ministério da Saúde. Estratégia de Vacinação contra Covid-19
2024. 2ª edição.

[estrategia-de-vacinacao-contr-a-covid-19-2024-2a-edicao](#)



DÚVIDAS?

Núcleo de Imunizações Zona Norte

F: 3289 5020/ 5021

vacinapoazn@gmail.com

Núcleo de Imunizações Zona Sul

F: 3289 2479/ 2457

vacinapoa@gmail.com

