



Estratégia de Vacinação contra Covid-19

2026



prefeitura de
PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Vacinas disponíveis

- Vacina covid-19-RNA_m, Pfizer (Comirnaty):

Composta de RNA mensageiro (RNA_m) de cadeia simples, envolvido em nanopartículas lipídicas, codificando a proteína S (spike) do SARS-CoV-2.



Vacinação Estratégia Rotina

- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade;
- Pessoas de 60 anos ou mais de idade;
- Gestantes.





Esquema Vacinal para Crianças

Toda a população entre **6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias** não vacinada ou com esquema vacinal incompleto, de acordo com a faixa etária, para vacinação de rotina no Calendário Nacional de Vacinação Infantil.

Meta para cobertura vacinal: 90%

Esquema Vacinal para Crianças - Pfizer (Comirnaty)



Idade(s)	Dose	Intervalo entre as doses
Crianças de 6 meses a 4 anos de idade, SEM VACINAÇÃO PRÉVIA.	Três doses de 0,2 mL cada, administradas por via intramuscular.	<ul style="list-style-type: none">• Administrar a segunda dose quatro semanas após a primeira dose.• Administrar a terceira dose oito semanas após a segunda dose.

Fonte: adaptado das informações presentes na bula da vacina Comirnaty®, Pfizer: https://www.pfizer.com.br/files/Comirnaty_Paciente_76.pdf

Esquema Vacinal para Crianças - Pfizer (Comirnaty)



- **Crianças com esquema incompleto:** aquelas que receberam vacinas contra COVID-19 CoronaVac ou Pfizer deverão completar o esquema com a vacina disponível;

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade **com comorbidades** que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber uma dose anual da vacina.

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade imunocomprometidas que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber duas doses da vacina, com intervalo mínimo de seis meses entre as doses.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO NOS CASOS DE INTERCAMBIALIDADE PARA CRIANÇAS DE 6 MESES A 4 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se uma dose da Pfizer pediátrica	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 2ª dose (D2)	D1 para D2: quatro semanas	Modelo informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 3ª dose (D3)		
	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	D2 para D3: oito semanas	
	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)		

ESQUEMA DE VACINAÇÃO NOS CASOS DE INTERCAMBIALIDADE PARA CRIANÇAS DE 6 MESES A 4 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se duas doses da Pfizer pediátrica	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	D1 para D2: quatro semanas	Modelo informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 3ª dose (D3)	D2 para D3: oito semanas	

ESQUEMA DE VACINAÇÃO NOS CASOS DE INTERCAMBIALIDADE PARA CRIANÇAS DE 6 MESES A 4 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se uma dose da CoronaVac	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 2ª dose (D2)	D1 para D2: quatro semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)		
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	D2 para D3: oito semanas	
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)		

ESQUEMA DE VACINAÇÃO NOS CASOS DE INTERCAMBIALIDADE PARA CRIANÇAS DE 6 MESES A 4 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

Crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3		Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se duas doses da CoronaVac	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNA, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)		D1 para D2: 4 semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: Rotina
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNA, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)		D2 para D3: 8 semanas	

ESQUEMA DE VACINAÇÃO NOS CASOS DE INTERCAMBIALIDADE PARA CRIANÇAS DE 6 MESES A 4 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se uma dose da Moderna	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 2ª dose (D2)	-	D1 para D2: quatro semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	D1 para D2: quatro semanas	
	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNA _m , Moderna (Spikevax) Registro: 2ª dose (D2)	D2 para D3: oito semanas	

Atenção!!!!



- Os esquemas primários deverão ser feitos priorizando o uso do mesmo imunizante do início de esquema (esquemas homólogos).
- Crianças de **6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias** de idade que **não completaram o esquema primário** dentro desse período, ao completarem 5 anos de idade serão considerados vacinados e terão seu esquema encerrado se tiver pelo menos uma dose.

Esquema Vacinal para Idosos



Será considerada toda a população a partir de 60 anos de idade, de acordo com a faixa etária, para vacinação de rotina no Calendário Nacional de Vacinação do Idoso.

Meta para a cobertura vacinal: 90%

Para a população a partir de 60 anos de idade a recomendação é o recebimento de **uma dose a cada seis meses**, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas.

Esquema Vacinal para Gestantes



Serão consideradas todas as gestantes, de acordo com a faixa etária, para vacinação de rotina no Calendário Nacional de Vacinação da Gestante. Recomenda-se uma dose em qualquer momento da gestação e em cada gestação, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas.

Meta para cobertura vacinal: 90%

A vacinação contra a covid-19 durante a gravidez tem sido recomendada amplamente para prevenir doença grave e mortes nesta população.

Para as gestantes não haverá exigência quanto à comprovação da situação gestacional, sendo suficiente para a vacinação que a própria mulher relate sua gravidez.

Vacinação de Grupos Especiais



São considerados para vacinação especial contra a covid-19 pessoas com 5 anos de idade ou mais (até 59 anos, 11 meses e 29 dias) e com maior vulnerabilidade:

Ex.: acesso insuficiente ao serviço de saúde ou condição que aumenta o risco para as formas graves da doença.

Por isso, essas populações têm indicação de dose anual ou a cada seis meses, dependendo do grupo, independentemente do número de doses prévias de vacinas covid-19.

Atenção!!!!



Para as doses periódicas, o intervalo mínimo entre a dose da vacina disponível e qualquer dose prévia de vacina covid-19 é de seis meses.

Exemplo: Trabalhador de Saúde que recebeu uma dose de vacina contra COVID em agosto/2025, não precisa esperar até agosto/2026 para receber a dose anual, desde que tenha se passado 6 meses da última dose.

Vacinação de Grupos Especiais

Dose Anual (Exceto Imunocomprometidos)

Grupos para vacinação especial
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência
Pessoas imunocomprometidas
Indígenas vivendo em terra indígena
Indígenas vivendo fora da terra indígena
Ribeirinhos
Quilombolas
Puérperas
Trabalhadores da saúde
Pessoas com deficiência permanente
Pessoas com comorbidades
Pessoas privadas de liberdade
Funcionários do sistema de privação de liberdade
Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas
Pessoas em situação de rua

Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Trabalhadores dos correios (NOTA TÉCNICA No 20/2025-DPNI/SVSA/MS)

Doença respiratória crônica
Doença cardíaca crônica
Doença renal crônica
Doença hepática crônica
Doença neurológica crônica
Diabetes
Imunossupressão
Obesidade grave (IMC≥40)
Transplantados
Portadores de trissomias

Vacinação de Grupos Especiais



PESSOAS DOS GRUPOS ESPECIAIS DE 5 a 11 ANOS DE IDADE:

Pessoas dos grupos especiais, exceto imunocomprometidos, independentemente do recebimento ou não de doses prévias de qualquer vacina covid-19, deverão receber **UMA DOSE ANUAL** da vacina Covid-19-RNAm, Pfizer, com o volume da dose e a formulação recomendadas para a idade.

PESSOAS DOS GRUPOS ESPECIAIS A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE:

Pessoas dos grupos especiais, exceto imunocomprometidos, independentemente do recebimento ou não de doses prévias de qualquer vacina covid-19, deverão receber **UMA DOSE ANUAL** da vacina Covid-19-RNAm, Pfizer, com o volume da dose e a formulação recomendadas para a idade.

Vacinação de Grupos Especiais



Gestantes, pessoas com deficiência, indígenas e povos tradicionais (quilombolas e ribeirinhos) não necessitam de comprovação.

Imunocomprometidos

Definição de indivíduos imunocomprometidos ou em condição de imunossupressão

Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea.

Pessoas vivendo com HIV (PVHIV).

Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias.
Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, ≥ 2 mg/kg/dia por mais de 14 dias até 10 kg.

Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão.

Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias).

Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise ou outras terapias substitutivas.

Pacientes oncológicos que realizam ou realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico e estão em acompanhamento.

Pessoas com neoplasias hematológicas.

Fonte: elaborado com base no *Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais*. 6ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

Imunocomprometidos



Pessoas com idade entre 5 e 11 anos de idade, imunocomprometidas, que nunca se vacinaram deverão receber o esquema primário de TRÊS DOSES da vacina Covid-19-RNA_m. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas.

Pessoas a partir de 12 anos de idade, adolescentes e adultos, imunocomprometidos que nunca se vacinaram deverão receber o esquema primário de TRÊS DOSES da vacina Covid-19-RNA_m. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas.

Imunocomprometidos



Pessoas imunocomprometidas que estão com o **esquema de vacinação incompleto** deverão **completar o esquema de TRÊS DOSES** com o imunizante disponível e a dose para a idade. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas.

Pessoas imunocomprometidas que estão com o **esquema de vacinação completo** deverão receber **DUAS DOSES** de vacinas covid-19 com intervalo de seis meses entre as doses.

APRESENTAÇÕES DISPONÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES



FORMULAÇÃO	5 a 11 anos (ou seja, 5 a menos de 12 anos de idade), prontos para uso	6 meses a 4 anos (ou seja, 6 meses a menos de 5 anos de idade), diluir para usar	6 meses a 4 anos (ou seja, 6 meses a menos de 5 anos de idade), diluir para usar	Maiores de 12 anos, prontos para uso
COR DA TAMPA	 Azul JN.1	 Vinho JN.1	 Amarela JN.1	 Cinza JN.1
Frasco	Multidose	Multidose	Multidose	Multidose
Dosagem	10 mcg	3 mcg	3 mcg	30 mcg
Diluição	Não diluir	Diluir	Diluir	Não diluir
Quantidade de diluente necessária por frasco	Não diluir	2,2 mL	1,1 mL	Não diluir
Volume de aplicação por dose (pós diluição ou não)	0,3 mL	0,2 mL	0,3 mL	0,3 mL
Doses por Frasco	6 doses por frasco	10 doses por frasco após diluição	3 doses por frasco após diluição	6 doses por frasco
Tempo de armazenamento em refrigerador (de 2 °C a 8 °C)	10 semanas	10 semanas	10 semanas	10 semanas
Tempo de armazenamento em freezer (de -25 °C a -15 °C)	NÃO ARMAZENAR	NÃO ARMAZENAR	NÃO ARMAZENAR	NÃO ARMAZENAR
Tempo de armazenamento em freezer de Ultra Baixa Temperatura - ULTF (de -90 °C a -60 °C)	18 meses (prazo de validade)	18 meses (prazo de validade)	18 meses (prazo de validade)	18 meses (prazo de validade)
Após a diluição (tampa vinho e amarela) ou primeira punção (tampa cinza e azul)	Descarte qualquer vacina não utilizada no prazo de 12 horas após a primeira punção. Conservado entre 2°C e 30°C	Descarte qualquer vacina não utilizada no prazo de 12 horas após a diluição. Conservado entre 2°C e 25°C	Descarte qualquer vacina não utilizada no prazo de 12 horas após a diluição. Conservado entre 2°C e 25°C	Descarte qualquer vacina não utilizada no prazo de 12 horas após a primeira punção. Conservado entre 2°C e 30°C

Transplantados de células-tronco hematopoiéticas (TCTH)

O transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) é um procedimento terapêutico com o objetivo de reconstruir o órgão hematopoiético. Estudos têm demonstrado que os transplantados de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) perdem a imunidade protetora no pós-transplante. Esses indivíduos devem ter seu esquema vacinal refeito.

Vacina	Esquema primário	Intervalo mínimo	Registro nos sistemas de informação
Vacina covid-19 disponível e recomendada para a faixa etária	D1, D2 e D3	Quatro semanas após a D1 e oito semanas após a D2	1ª dose revacinação (D1 REV) 2ª dose revacinação (D2 REV) 3ª dose revacinação (D3 REV)



Pessoas a partir dos 5 anos de idade que não fazem parte dos grupos prioritários:

Não há mais a recomendação de vacinação contra Covid-19.

Aqueles que não tem nenhum histórico vacinal, se solicitarem, poderão receber UMA DOSE da vacina disponível para a idade.

Já os vacinados com, pelo menos, uma dose de qualquer vacina Covid-19 estão com o esquema encerrado.

Evento Supostamente Atribuíveis à Vacinação e Imunização (ESAVI)



Casos graves, inusitados e raros

Especificações de segurança	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika
Considerações gerais	Plataforma não replicante e não integradora		
Manifestações locais	Dor local, vermelhidão e edema.	Dor local, vermelhidão, edema e linfadenopatia leves e moderados. Mais intensos na segunda dose.	Dor local, fadiga, dor de cabeça, mialgia, calafrios e artralgia.
Manifestações sistêmicas	Fadiga, cefaleia, mialgia, artralgia, tremores, diarreia, febre, náuseas e vômitos.	Fadiga, sonolência, perda de apetite, cefaleia, mialgia e calafrios. Mais intensos na segunda dose.	Reações relacionadas à ansiedade, incluindo reações vasovagais (síncope), hiperventilação ou reações relacionadas ao estresse associado à vacinação como uma resposta psicogênica à injeção com agulha.

Precauções e Contraindicações

- Pessoa com histórico de reações alérgicas;
- Pessoa com histórico de trombocitopenia e perturbações da coagulação;
- Pessoa com infecção pelo SARS-CoV-2;
- Pessoa com outra infecção aguda;
- Miocardite/pericardite;
- Reações associadas à ansiedade;
- Exacerbações da síndrome de transudação capilar (STC).

Doação de Sangue



De acordo com a Anvisa, os candidatos elegíveis à doação de sangue que tiverem sido vacinados contra a covid-19 devem ser considerados inaptos pelo período de sete dias, após a vacinação, se as vacinas forem RNAm ou vetor viral.

Administração Simultânea

Pode ser administrada concomitantemente com outras vacinas do calendário, exceto a vacina contra Monkeypox:

- Pessoas que já receberam a vacina contra Covid-19, não há intervalo mínimo para receber a vacina contra monkeypox;
- Pessoas que já recebeu vacina contra Mpox, recomenda-se intervalo de 4 semanas para vacina contra Covid-19.

Registros

O registro deve ser realizado como **ROTINA**:

- crianças (D1, D2 e D3)
- gestantes e idosos - Dose

ESPECIAL para os grupos prioritários - DOSE

Atenção: uma gestante que é profissional de saúde, por exemplo, deverá ser registrada como estratégia ROTINA - Grupo DE ATENDIMENTO: GESTANTE.


Movimentação



A movimentação de imunobiológicos na sala de vacina – entrada e saída – será feita no módulo exclusivo do Novo SI-PNI;

Deverá ser atualizada toda vez que houver recebimento de vacina ou quando houver saída pelos seguintes motivos: utilização (no de doses por frasco aberto), transferência de doses, quebra do frasco, falta de energia elétrica, falha de equipamento, validade vencida, procedimento inadequado, falha de transporte e indisponibilidade visando controlar os estoques no município e no estabelecimento de saúde.

Referências



Ministério da Saúde. Estratégia de Vacinação contra Covid-19 2024.
2ª edição.

[estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-2024-2a-edicao](https://www.gov.br/saude/pt-br/publicacoes/estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-2024-2a-edicao)



Registro de Vacinação eSUS Pec

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1pCyWUPnrOooPWs9psn7KGW-P9OO2Metx>

*“É ROTINA ou ESPECIAL?”
“É 1ª dose ou dose única?”
“Como registro o esquema especial do HPV?”*

A Equipe de Imunizações/Poa lança o manual de **REGISTROS DE VACINAÇÃO e-SUS PEC** para guiar os profissionais das unidades de saúde no cadastro das doses aplicadas.

O registro adequado é fundamental para composição da cobertura vacinal!

Consulte sempre a versão atualizada pelo QR Code abaixo.

REGISTROS DE VACINAÇÃO
eSUS Pec

Quem cuida, vacina!

EQUIPE DE IMUNIZAÇÕES

Site DVS Imunizações



Diretoria de Vigilância em Saúde

EPIDEMIOLÓGICA ▾ AMBIENTAL ▾ SANITÁRIA ▾ TRABALHADOR ▾ INFO

Imunizações



A Equipe de Imunizações é o responsável pela implementação e execução do Programa Nacional de Imunizações (I) setor trabalha com o abastecimento, distribuição, monitoramento, capacitação da rede e suporte técnico, entre outros imunobiológicos e soros contra toxinas.

A Equipe é composta por dois núcleos, que realizam o abastecimento das unidades de saúde de acordo com as seg

- Núcleo de Imunizações Zona Sul - Distribuição para as regiões Sul, Centro-Sul, Restinga, Extremo Sul, Glória, Cr

Material de Apoio

- ▾ Manuais PNI e Instruções Normativas
- ▾ Notas Técnicas e Informes
- ▾ Procedimento Operacional Padrão
- ▾ Plano Contingência para Rede de Frio
- ▾ Calendários de Vacinação Especiais
- ▾ Apresentações
- ▾ Formulários
- ▾ Movimentação Mensal
- ▾ Registros de Vacinação - Cadastro de Laboratórios e-SUS
- ▾ Atendimento Antirrábico
- ▾ Vacina dTpa
- ▾ Vacinação contra Influenza - 2025
- ▾ Vacinação contra Varicela
- ▾ Vacinação contra Hepatite B
- ▾ Vacina contra Monkeypox
- ▾ Vacinação contra Vírus Sincial Respiratório (VSR) - Vacina Abrysvo - Vacinação Gestantes



Grupo *Whatsapp* Informes Equipe de Imunizações

Grupo para divulgação de informações





DÚVIDAS?

Núcleo de Imunizações Zona Norte

F: 3289 5020/ 5021

vacinapoazn@gmail.com

Núcleo de Imunizações Zona Sul

F: 3289 2479/ 2457

vacinapoa@gmail.com

