


10 de novembro, Dia Mundial de Combate ao HTLV

- O HTLV - vírus linfotrópico de células T humanas é um agente infeccioso que atinge as células de defesa do organismo, os linfócitos T.
- O vírus está associado a doenças neurológicas, oftalmológicas e dermatológicas e à leucemia/linfoma.
- Não há vacina, tratamento ou cura para o HTLV. Os cuidados são direcionados às doenças causadas pelo HTLV.
- Cerca de **90% das pessoas infectadas pelo vírus serão assintomáticas** por toda a vida. Mesmo assim, elas vão transmitir o vírus pela via sexual, sanguínea e vertical (gestante para bebê).
- A prevenção e o controle se dão pelo bloqueio das formas de transmissão: usar preservativo interno ou externo, inibir o aleitamento, em caso confirmado de infecção pelo vírus HTLV, evitar compartilhar agulhas, seringas ou objetos perfurocortantes, evitar contato com sangue infectado.
- O diagnóstico sorológico da infecção é por meio de exame de sangue. É necessário um teste de triagem e um teste confirmatório para confirmar a infecção pelo HTLV.
- No figura 1 observa-se que nos anos de 2024 e 2025, a proporção de testes confirmatórios realizados foi pequeno, com valores de 35% e 25%, respectivamente. Isto impossibilita o diagnóstico preciso da cidade.
- Em gestantes, o teste de triagem deve ser solicitado na primeira consulta de pré-natal. Isso é essencial, porque o aleitamento materno é a principal forma de transmissão vertical da infecção: de 20% a 30% de bebês amamentados por lactantes infectadas serão infectados.
- A Nota Técnica nº12/2025 do Ministério da Saúde estabelece que a notificação é compulsória e define os critérios para notificar suspeitas e casos em gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical do HTLV.
- O sistema oficial para notificação de caso confirmado é o e-SUS SINAN. As notificações iniciaram nesse sistema a partir de 01/09/2025.
- Até novembro de 2025, Porto Alegre registra 2 notificações de infecção pelo HTLV em gestantes, 1 notificação de infecção pelo HTLV em puérpera, 1 notificação de infecção pelo HTLV em criança exposta e 7 de infecção pelo HTLV entre pessoas que moram na Capital.

Figura 1 - Proporção de testes de triagem reagente ou inconclusivo e de testes confirmatórios realizados. Porto Alegre, Porto Alegre, 2025



Fonte: Banco de dados interno EVDT/DVS/SMS - Dados provisórios em 10/11/2025