

CALENDÁRIO VACINAL - CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV E PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS

Bebês, Crianças e Adolescentes

CRIANÇA CONSIDERADA EXPOSTA¹⁰

Ao nascer	BCG ¹ Hepatite B	Dose única Dose inicial
2 meses	Pentavalente (DTP+Hib+ HB) Vacina poliomielite inativada (VIP) Vacina oral rotavírus humano ¹ Vacina pneumocócica 13 (CRIE)	1ª Dose
3 meses	Meningocócica ACWY	1ª Dose
4 meses	Pentavalente (DTP+Hib+ HB) Vacina poliomielite inativada (VIP) Vacina oral rotavírus humano ¹ Vacina pneumocócica 13 (CRIE)	2ª Dose
5 meses	Meningocócica ACWY	2ª Dose
6 meses	Pentavalente (DTP+Hib+ HB) Vacina poliomielite inativada (VIP) Vacina pneumocócica 13 (CRIE) Covid-19 *	3ª Dose 1ª Dose
9 meses	Febre Amarela ¹	1ª Dose
12 meses	Vacina pneumocócica 13 ³ (CRIE) Tríplice viral ^{1,5} Varicela ^{1,5} Hepatite A	Reforço 1ª Dose 1ª Dose 1ª Dose
15 meses	Pentavalente (DTP+Hib+ HB) ² Vacina poliomielite inativada (VIP) Meningocócica ACWY ³ Tríplice viral ^{1,5} Varicela ^{1,5}	1º Reforço 1º Reforço 1º Reforço 2ª Dose 2ª Dose
18 meses	Hepatite A	2ª Dose
24 meses	Vacina pneumocócica 23 (CRIE)	1ª dose

1- Vacinas atenuadas somente serão administradas em pacientes imunocompetentes ou com liberação médica.

2- Recomenda-se a realização de sorologia Anti-HBs 30 a 60 dias após o término do esquema. Se anti AGHBs <10 UI/mL, repetir esquema de 4 doses com vacina hepatite B monovalente, com o dobro da dose. Pessoas não vacinadas previamente, usar o esquema de 4 doses da vacina HB monovalente, com o dobro da dose conforme o laboratório produtor para a faixa etária. É indicada retestagem anual de anti-HBs para verificar se encontra-se em níveis protetores. Caso esteja abaixo de 10mUI/mL, nova dose de reforço (com dose dobrada) deve ser aplicada e novamente checada a resposta vacinal após 30 a 60 dias.

3 - Criança acima dos 12 meses (PVC13) ou dos 15 meses (Men ACWY) sem comprovação desses imunos, realizar 2 doses com intervalo de 60 dias. Meningo ACWY realizar reforço a cada 5 anos, se HIV+ estratégia especial.

4- Vacina *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) para maiores de 12 meses nunca vacinados.

5- Crianças expostas ao HIV ou HIV+ não devem receber Tetraviral.

* Covid-19: Esquema de 2 ou 3 doses de acordo com o laboratório disponível.

4 anos	Tríplice bacteriana (DTP) Vacina poliomielite inativada (VIP) Febre Amarela ¹	2º Reforço 2º Reforço Reforço
5 anos	Vacina pneumocócica 13 ⁷ (CRIE)	1ª Dose
6 anos	Meningocócica ACWY ¹¹	2º Reforço (realizar reforço a cada 5 anos)
7 anos	Vacina pneumocócica 23 (CRIE)	2ª Dose
9 a 17 anos	Hepatite B ² Dupla Adulto (dT) HPV Meningocócica ACWY ¹¹ Vacinas pneumocócicas ⁷ (CRIE) Hib ⁴ (CRIE) Febre Amarela ¹ Tríplice viral ¹ Varicela ¹ Hepatite A ⁶ (CRIE)	4 doses (esquema 0, 1, 2 e 6 meses) 3 doses com intervalo de 60 dias (reforço a cada 10 anos) 3 doses (esquema 0, 2 e 6 meses) 2 doses com intervalo de 8 semanas e reforço a cada 5 anos Dose única com pneumo 13 ⁷ . Após 8 semanas realizar 1ª dose de pneumo 23 e uma 2ª dose 5 anos após 2 doses com intervalo de 60 dias Reforço ou dose única ⁸ 2 doses com 30 dias de intervalo mínimo 2 doses com intervalo de 3 meses (1 a 12 anos) e de 8 semanas (acima de 13 anos) 2 doses com 6 meses de intervalo

Adultos

Acima de 18 anos	Hepatite B ² Dupla Adulto (dT) Febre Amarela ¹ Tríplice viral ¹ Hib ⁴ (CRIE) Varicela ¹ Hepatite A ⁶ (CRIE) Vacinas pneumocócicas ⁷ (CRIE) Meningocócica ACWY ¹¹ HPV (até 45 anos de idade)	4 doses (esquema 0, 1, 2 e 6 meses) 3 doses com intervalo de 60 dias (reforço a cada 10 anos) Reforço ou dose única ⁸ 2 doses com 30 dias de intervalo mínimo 2 doses com intervalo de 60 dias 2 doses com 30 dias de intervalo 2 doses com 6 meses de intervalo Dose única com pneumo 13 ⁷ . Após 8 semanas realizar 1ª dose de Pneumo 23 e uma 2ª dose 5 anos após 2 doses com intervalo de 8 semanas e reforço a cada 5 anos 3 doses (esquema 0, 2 e 6 meses)
------------------	--	---

6 - Caso não tenha recebido previamente.

7 - Para caso não tenha recebido previamente a Pneumo 13.

8 - De acordo com a situação vacinal encontrada. Realizar reforço se tiver recebido somente uma dose antes dos 5 anos.

9 - O esquema vacinal contra Covid-19 está disponível a partir dos 6 meses até os 4 anos, 11 meses e 29 dias

10 - Crianças expostas verticalmente ao HIV devem receber as vacinas indicadas nesse calendário até os 18 meses de idade. Após essa idade e excluída a infecção pelo HIV, devem seguir o esquema básico vacinal recomendado pelo PNI, à exceção da pólio (realizar 1 e 2º reforço de VIP - 15 meses e 4 aos 6 anos) e influenza anualmente, por conviverem com pessoas com imunodeficiência.

11 - Pessoas com esquema completo de 2 doses de Meningo C devem refazê-lo com a ACWY, com intervalo de 8 semanas e reforço a cada 5 anos.



Atualização Janeiro/2026



Prefeitura de
Porto Alegre
SECRETARIA DE SAÚDE