



FAIXAS ETÁRIAS PARA APLICAÇÃO DAS VACINAS

INDICAÇÃO	VACINA	IDADE LIMITE
Ao nascer	Hepatite B (primeira dose do recém nascido)	30 dias
2 meses	Rotavírus 1ª dose	11 meses e 29 dias
2 e 4 meses	Pneumo 20 (esquema básico)	
3 e 5 meses	Meningo C (esquema básico)	
4 meses	Rotavírus 2ª dose (somente se recebeu a primeira dose)	1 ano, 11 meses e 29 dias
Ao nascer	BCG	4 anos, 11 meses e 29 dias
2, 4 e 6 meses	VIP (esquema básico)	
A partir de 6 meses	COVID-19	
12 meses	Meningo ACWY (reforço ou dose única)	
	Pneumo 20 (reforço ou dose única)	
15 meses	VIP (1º Reforço)	
	Hepatite A	
	Tetra viral	
4 anos	VIP (2º Reforço)	
2, 4 e 6 meses	Pentavalente	
15 meses	DTP- 1ª dose de reforço	
4 anos	Varicela - 2ª dose (exceto profissionais da saúde)	
	DTP - 2ª dose de reforço	
9 anos	HPV - Dose única	14 anos, 11 meses e 29 dias
11 anos	Meningo ACWY	
9 anos	HPV em imunodeprimidos (indicações: ver manual do CRIE)	45 anos, 11 meses e 29 dias
9 meses 4 anos	Febre Amarela (≥ 60 anos apenas com liberação médica)	59 anos 11 meses e 29 dias
12 meses 15 meses	Tríplice Viral (exceto trabalhadores de saúde e pacientes que vivem com HIV)	

Dengue: Indicações, esquema vacinal e faixas etárias de acordo com o laboratório e as orientações do MS.