



PROVA OBJETIVA – Nível Superior
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA - DERMATOLOGIA
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS
CONCURSO PÚBLICO – Edital de Abertura nº 059/2022

ANTES DA PROVA:



**Olá! Leia as orientações
para a realização da prova conforme
o Edital de Abertura. Boa sorte!**



- * Confira seus dados na Grade de Respostas: Nome, Nº de Inscrição e Cargo. Caso haja equívoco, comunique imediatamente ao fiscal da sala.
- * Verifique se este caderno corresponde ao cargo ao qual você realizou sua inscrição e contém o número de questões conforme expresso em edital. Caso contrário, solicite a substituição do caderno.
- * Selecione APENAS UMA alternativa correta para cada questão, que contam com 5 alternativas de resposta (A, B, C, D, E).
- * Seus aparelhos eletrônicos (relógios, celulares...) devem estar acondicionados dentro do envelope de segurança fornecido, que deve ser lacrado antes de entrar na sala.

DURANTE A PROVA:



- * Preencha e assine a Grade de Respostas e a Ata de Presença, conforme o documento apresentado, utilizando caneta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, marca-texto e outros itens durante a realização da prova.
- * Preencha a Grade de Respostas marcando apenas uma alternativa para cada questão. Questões rasuradas, com mais de uma marcação ou em branco serão anuladas.
- * Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de materiais de consulta de qualquer natureza.
- * Nenhuma questão será anulada durante o período de prova. Escolha sempre uma das alternativas. Você poderá solicitar Recurso Administrativo sobre o gabarito preliminar, conforme datas do cronograma de execução.
- * Fique atento ao tempo de realização da prova, incluindo o preenchimento da Grade de Respostas conforme orientação apresentada na sala.

APÓS A PROVA:



- * Você poderá levar consigo o Caderno de Questões após 02 (duas) horas do início da prova.
- * Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal da sala, aguardando a autorização para entregar a Grade de Respostas.
- * Os dois últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de assinar o termo de encerramento das atividades da sala.
- * O gabarito preliminar será divulgado conforme o cronograma de execução deste edital.



Direitos autorais reservados à Fundação La Salle.
Proibida Reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Acesse o site:
www.fundacaolasalle.org.br/concursos
ou utilize o QR code ao lado.



LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

A geração Covid: o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças

01 A conta chegou! Como era de esperar, a pandemia deixou cicatrizes no
02 desenvolvimento dos nossos filhos. É o que documentam os primeiros estudos sobre a
03 chamada Geração Covid, aquela que nasceu ou cresceu durante o período de restrições
04 desencadeadas pelo coronavírus.

05 Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte
06 dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a
07 exploração do mundo. O universo ficou confinado ___ paredes de casa, a interação com os
08 outros encolheu e o acesso __ educação e às opções de lazer também saiu prejudicado.

09 Já dava para antever os efeitos desse cenário conturbado no desenvolvimento físico,
10 _____ e emocional dos mais novos. E, de fato, a ciência desnuda agora as consequências.

11 Uma pesquisa da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos, comparou a evolução
12 esperada de bebês de 6 meses nascidos antes e durante a pandemia. Resultado: os
13 especialistas notaram que os pequenos que _____ ao mundo em meio ao isolamento
14 tiveram pontuações mais baixas no desenvolvimento motor — importante para virar sozinho de
15 barriga pra baixo e pegar um brinquedo com as mãos, por exemplo — e socioemocional, aquele
16 que molda o convívio com pessoas fora do círculo familiar.

17 Para a psicóloga Maria Beatriz Martins Linhares, professora sênior da Faculdade de
18 Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), esses achados eram
19 previstos. “A primeira infância é a fase em que a arquitetura cerebral está pulsante, é o momento
20 ideal para aprender e ganhar habilidades básicas para a trajetória do desenvolvimento humano”,
21 justifica. É nessa janela temporal que o contato com a natureza e os outros, as brincadeiras ao
22 ar livre e a vivência de desafios estimulam o cérebro e _____ o corpo crescer com saúde.

23 Tudo isso foi podado entre os filhos da pandemia. “A restrição das atividades nos
24 primeiros anos de vida claramente impacta no curto, no médio e no longo prazo. A área do
25 cérebro ligada __ integração social fica comprometida, bem como as habilidades cognitivas e
26 as relacionadas ao planejamento motor”, resume a neuropediatra Liubiana Arantes, presidente
27 do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

28 As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam
29 mais palpável a angústia dos pais dessa geração. _____ daqueles que começaram a
30 desconfiar de atrasos no aprendizado de tarefas como engatinhar, andar e falar.

31 A saúde mental também não passou em branco — mesmo entre os novinhos de tudo.
32 No Brasil, um estudo conduzido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a
33 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um crescimento significativo no número
34 de bebês que, aos 6 meses, apresentavam irritabilidade e dificuldades de adaptação à rotina.

35 “Sabemos que a pandemia aumentou a sobrecarga dos pais, e esses comportamentos
36 infantis podem ser entendidos como um reflexo do estresse parental, do uso frequente de telas
37 ou mesmo da falha em compreender e atender as demandas das crianças”, analisa __ pediatra
38 Claudia Lindgren Alves, professora da UFMG e coordenadora do trabalho.

39 Segundo Maria Beatriz, o estresse crônico, em todos os sentidos, deve ser encarado
40 como um fator de risco para o desenvolvimento infantil. “A chance de haver impactos negativos
41 em um cenário estressor é sempre potencializada”, afirma a psicóloga e docente da USP.

Disponível em < <https://saude.abril.com.br/familia/a-geracao-covid-o-impacto-da-pandemia-no-desenvolvimento-das-criancas/> > (adaptado).

01. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 07, 08, 25 e 37.

- A) as – à – à – a.
- B) às – a – à – a.
- C) às – à – à – a.
- D) às – à – à – à.
- E) as – à – a – a.

02. Considerado a ortografia vigente, as lacunas das linhas 10, 13, 22 e 29 devem ser, respectivamente, preenchidas por

- A) psíquico – chegaram – fazem – Sobre tudo.
- B) psíquico – chegaram – fazem – Sobretudo.
- C) písíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- D) pissíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- E) písíquico – chegaram – faz – Sobre tudo.

03. Sobre as palavras “psicóloga” e “achados”, avalie as afirmações abaixo e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

- () Ambas são paroxítonas.
() Ambas possuem hiato.
() Somente a segunda possui dígrafo.
() A primeira possui tritongo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
B) V – F – V – F.
C) F – F – F – F.
D) V – V – F – V.
E) F – F – V – F.

04. Na linha 01, o verbo “deixou”, no contexto em que se encontra, é

- A) intransitivo.
B) transitivo direto.
C) transitivo indireto.
D) transitivo direto e indireto.
E) de ligação.

05. Analise as afirmativas abaixo.

- I - Na linha 07, o termo “O universo”, no contexto em que se encontra, é o sujeito da oração.
II - Na linha 12, o termo “a”, no contexto em que se encontra, é adjunto adnominal.
III - Na linha 31, o termo “saúde”, no contexto em que se encontra, é o núcleo do sujeito composto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

06. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.

- I - O texto ratifica que a pandemia trouxe malefícios para as crianças.
II - Maria Beatriz Linhares não concorda com os resultados obtidos pela pesquisa da Universidade Colúmbia.
III - Somente a Universidade Colúmbia realizou estudos sobre o assunto abordado no texto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

07. Analise o trecho a seguir:

“Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a exploração do mundo.”

Ao trocarmos a expressão “boa parte dos pequenos” por “os pequenos”, quantas palavras sofreriam, obrigatoriamente, alteração para fins de concordância?

- A) Uma
B) Duas
C) Três
D) Quatro
E) Cinco

08. Em “As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam mais palpável a angústia dos pais dessa geração.” é correto afirmar que há,

- A) conjunção alternativa e interjeição.
- B) advérbio e artigo indefinido.
- C) pronome possessivo e conjunção alternativa.
- D) artigo indefinido e preposição essencial.
- E) artigo definido e preposição essencial.

09. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

(1) Verbo pertencente à primeira conjugação.	() Chegou
(2) Verbo pertencente à segunda conjugação.	() Impacta
(3) Verbo pertencente à terceira conjugação.	() Sabemos
	() Saiu

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) 1 – 1 – 2 – 3.
- B) 1 – 1 – 3 – 2.
- C) 3 – 3 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1 – 2.
- E) 1 – 3 – 2 – 1.

10. Observe as seguintes perguntas:

- I – Quantos bebês participaram da pesquisa realizada pela Universidade Colúmbia?
- II – Qual o cargo de Liubiana Arantes na Sociedade Brasileira de Pediatria?
- III – Quem faz parte da Geração Covid?

Das perguntas acima, qual(is) é(são) respondida(s) pelo texto?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

LEGISLAÇÃO

11. No que tange à Lei de Improbidade Administrativa, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá:

- A) Mandado de segurança.
- B) Apelação.
- C) Agravo de instrumento.
- D) Recurso ordinário.
- E) Recurso extraordinário.

12. No que tange ao Estatuto do Idoso, relativamente ao seu direito à saúde, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- C) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
- D) É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- E) O idoso que não esteja no pleno gozo de suas faculdades mentais, incapaz de optar pela realização de tratamento de saúde, deverá ser encaminhado por seu médico quando ocorrer iminente risco de morte, independente de notificação a familiares ou ao Ministério Público, em razão do estado de necessidade do paciente.

13. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, EXCETO:

- A) Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste.
- B) Certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que destituiu o poder familiar dos pais biológicos.
- C) Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
- D) Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo.
- E) Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão.

14. No que concerne à Lei Maria da Penha, marque a alternativa CORRETA:

- A) Os crimes praticados contra a mulher serão julgados pelos Juizados Especiais Criminais, previstos na Lei nº 9099/95.
- B) Os delitos punidos na Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, isto é, independem da vontade da vítima quando do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
- C) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, sem exceções.
- D) Como medida protetiva de distanciamento do agressor em relação à vítima, os juízes, por força de previsão na Lei, fixam o mínimo de 200 (duzentos) metros entre os envolvidos.
- E) Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

15. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social em atividades em creches e unidades sanitárias terão uma gratificação correspondente a:

- A) 20% (vinte por cento) do valor líquido do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- B) 20% (vinte por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sem a incidência de vantagens.
- C) 25% (vinte e cinco por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.
- D) 25% (vinte e cinco por cento) do valor bruto do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- E) 30% (trinta por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

16. Dos direitos à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana e ao esporte e lazer NÃO compreendem:

- A) A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica.
- B) A comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.
- C) A assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluindo-se àqueles submetidos a pena privativa de liberdade.
- D) A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos da Lei Maior.
- E) É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

17. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, relativamente ao aproveitamento é INCORRETO afirmar que:

- A) No aproveitamento, terá preferência o que estiver a mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal
- B) O funcionário que, no prazo de trinta dias, não entrar em exercício será considerado em abandono do cargo.
- C) O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental, mediante perícia médica.
- D) Em casos de aproveitamento, provada em perícia médica a incapacidade definitiva para o serviço público em geral, o funcionário será aposentado.
- E) O funcionário não poderá ser aproveitado a pedido em cargo de natureza diversa daquele de que era titular.

18. No que concerne ao direito à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer, pelo Estatuto Estadual da Igualdade Racial, o Estado deverá promover políticas que valorizem a cultura por exemplo:

- A) Do *hip hop*, do *rap* e do *funk*.
- B) Do *hip hop*, do *brake dance* e do *blues*.
- C) Do *rap* e da pintura de grafite.
- D) Do *brake dance* e do *funk*.
- E) Do *hip hop* e do sertanejo universitário.

19. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, segundo a Constituição Federal, é de competência:

- A) Exclusiva dos municípios.
- B) Privativa dos Estados.
- C) Privativa da União e do Distrito Federal.
- D) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- E) Comum dos Estados e municípios, apenas.

20. De acordo com expressa previsão da Lei complementar 478/2002, NÃO são consideradas acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho:

- I - a doença degenerativa.
- II - a inerente a grupo etário.
- III - a que não produza incapacidade laborativa.
- IV - a síndrome do pânico e a síndrome de *burnout*.

Das assertivas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre a Epidermólise Bolhosa Hereditária, é CORRETO afirmar:

- A) Corresponde a um grupo raro de doenças genéticas que pode ser classificado clinicamente em três tipos principais: epidermólise bolhosa simples, epidermólise bolhosa distrófica e epidermólise bolhosa juncional.
- B) A epidermólise bolhosa distrófica é causada por mutações nos genes responsáveis pela síntese da laminina 332, ocasionando clivagem da pele ao nível da sublâmina densa.
- C) A epidermólise bolhosa simples pode ser subdividida em basal e suprabasal, ambas decorrentes de mutações nos genes que sintetizam as citoqueratinas 5 e 14.
- D) A síndrome LOC (laringo-onico-cutâneo) é um subtipo de epidermólise bolhosa juncional relacionada a mutação no gene ITGA3.
- E) A variante de Ogna é um subtipo de epidermólise bolhosa simples basal com tendência ao comprometimento acral, desenvolvimento de bolhas hemorrágicas e onicogribose.

22. Sobre a Dermatite Atópica é CORRETO afirmar:

- A) A dermatite atópica é uma doença genética complexa que não sofre influência de fatores ambientais.
- B) Mutações no gene da filagrina (FLG) são responsáveis pela ictiose vulgar e também representam um dos principais fatores de predisposição para a dermatite atópica.
- C) São consideradas características diagnósticas maiores da doença a presença de prurido, o curso crônico ou cronicamente recidivante, o histórico pessoal ou familiar de atopia e o nível elevado de IgE sérica.
- D) Os eczemas da dermatite atópica acometem tipicamente áreas flexurais e essa distribuição independe da faixa etária.
- E) As citocinas de Th2 (IL-4, IL-5, IL-13) predominam em lesões crônicas de dermatite atópica e no sistema imunológico de segundo plano da dermatite atópica associada à IgE.

23. Sobre a hanseníase é CORRETO afirmar:

- A) O resultado negativo de uma baciloscopia não exclui o diagnóstico clínico da hanseníase, mas classifica o doente obrigatoriamente como paucibacilar.
- B) Na reação hansênica tipo 1, poderá haver surgimento abrupto de novas lesões de pele até 5 anos após a alta medicamentosa.
- C) Na reação hansênica tipo 2 podem ser observadas lesões nodulares, quentes, dolorosas e por vezes ulceradas, mas não há comprometimento sistêmico como anemia, leucocitose com desvio à esquerda ou acometimento de órgãos como fígado, rins, testículos e suprarenais.
- D) O tratamento da reação hansênica tipo 2 requer sempre a prescrição de corticoterapia em associação à talidomida ou pentoxifilina.
- E) Os surtos reacionais costumam ser autolimitados, sendo em média de 1 mês para a reação hansênica tipo 1 e de 3 a 6 meses para a reação hansênica tipo 2.

24. Analise as afirmações abaixo sobre o uso de anestésicos na dermatologia e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () Os anestésicos locais podem ser classificados em dois grupos, as amidas e os ésteres, dependendo do tipo de ligação em sua cadeia intermediária.
- () Os aditivos aos anestésicos locais incluem a epinefrina, o bicarbonato de sódio e a hialuronidase.
- () A dosagem máxima recomendada de lidocaína simples (sem epinefrina) e em concentração padrão (1-2%) é equivalente a 5 mg/kg. Quando há adição da epinefrina, a dosagem máxima da lidocaína em concentração padrão de 1-2% é equivalente a 7 mg/kg.
- () Os sintomas de superdosagem dos anestésicos locais incluem alterações do sistema nervoso central e cardiovascular e não estão diretamente relacionados ao nível sérico do medicamento.
- () Os sintomas cardiovasculares e pulmonares normalmente se desenvolvem em doses mais altas de anestésico do que os sintomas iniciais do sistema nervoso central. Eles incluem hipotensão, parada cardíaca e parada respiratória.

A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) V – V – V – V – V
- B) F – V – F – F – F
- C) V – F – V – V – F
- D) V – V – V – F – V
- E) F – F – F – F – F

25. Sobre a Esporotricose humana é CORRETO afirmar:

- A) É causada por fungos do gênero *Sporothrix*, que pode apresentar 2 formas no seu ciclo de vida: filamentosa e leveduriforme. A forma que parasita os humanos é a filamentosa.
- B) A infecção ocorre principalmente pelo contato do fungo com a pele ou mucosa, que normalmente se dá através da manipulação de solo contaminado com fezes de pássaros.
- C) A esporotricose linfocutânea é a forma mais frequente da doença e se manifesta pela formação de nódulos cutâneos e subcutâneos que seguem trajeto linfático, sendo o tronco o local mais frequentemente acometido.
- D) Técnicas sorológicas são ferramentas que auxiliam no diagnóstico rápido tanto das formas clássicas como das atípicas da doença, e o resultado negativo é capaz de afastar o diagnóstico.
- E) Os antifúngicos utilizados para o tratamento da esporotricose humana são o itraconazol, o iodeto de potássio, a terbinafina e o complexo lipídico de anfotericina B.

26. Sobre o Penfigoide Gestacional é CORRETO afirmar:

- A) O penfigoide gestacional é uma doença bolhosa rara, de origem autoimune, curso autolimitado, que se desenvolve classicamente no final da gravidez ou no pós-parto imediato e não tem a capacidade de afetar a pele do recém-nascido.
- B) Do ponto de vista histopatológico, o componente essencial para o diagnóstico da doença é a detecção de uma deposição linear de C3 ao longo da zona de membrana basal (ZMB) da pele perilesional, que é vista por meio de microscopia de imunofluorescência direta.
- C) Tem sido observado maior risco de prematuridade e de recém-nascidos pequenos para idade gestacional, provavelmente em decorrência de insuficiência placentária. Este risco, entretanto, não parece estar relacionado à gravidade do penfigoide gestacional.
- D) Um aumento na incidência de anticorpos antitireoideanos foi documentado, frequentemente associado a uma disfunção clínica aparente da tireoide.
- E) Casos mais graves e refratários da doença podem requerer tratamento com drogas como ciclofosfamida, dapsona e metotrexato, mesmo antes do término da gestação.

27. Sobre as dermatoses neonatais é CORRETO afirmar:

- A) A Miliária é uma dermatose ocasionada pela obstrução dos ductos apócrinos, frequentemente relacionada a altas temperaturas, tanto endógenas quanto exógenas.
- B) A Pustulose Cefálica Neonatal é uma erupção inflamatória caracterizada pela presença de comedões, pápulas e pústulas, com acometimento predominante do couro cabeludo, fronte e mento.
- C) O Eritema Tóxico Neonatal é uma condição benigna comum, caracterizado pela presença de máculas, pápulas, vesículas/pústulas e urticas, que mais frequentemente se inicia nas primeiras 24 a 48h de vida, mas pode já estar presente ao nascimento.
- D) A Melanose Pustulosa Transitória Neonatal se manifesta clinicamente através de um contínuo composto por três fases distintas. A primeira fase é caracterizada pelo surgimento de vesicopústulas sem eritema, por volta da terceira semana de vida (raramente presentes ao nascimento). Tais lesões rompem e dão origem a máculas discretamente hiperpigmentadas com um fino colarete de escamas, que representam a segunda fase. Por fim, a descamação desaparece e restam apenas as máculas hiperpigmentadas que podem se assemelhar a lentigos simples.
- E) As Bolhas de Sucção costumam acometer áreas como antebraços, punhos, mãos e dedos e se caracterizam por bolhas tensas sobrepostas a bases inflamadas que se rompem e dão origem a erosões arredondadas ou lineares.

28. Sobre a Rosácea é CORRETO afirmar:

- A) Ácaros Demodex são encontrados em número aumentado em pacientes com rosácea, e essa infestação parece estar associada a um intenso infiltrado perifolicular predominantemente composto por células T auxiliares CD4.
- B) O sistema imunológico inato parece estar preservado.
- C) A disfunção da barreira epidérmica é observada em todos os subtipos da doença, sendo responsável por uma maior perda transepidérmica de água e também por um limiar mais baixo para irritação da pele.
- D) A rosácea fimatosa acomete exclusivamente o nariz e é considerada um estágio avançado da doença, onde já se observa hipertrofia das glândulas sebáceas.
- E) A rosácea ocular é frequentemente vista em associação à rosácea eritematotelangiectásica e papulopustulosa, porém nunca isoladamente.

29. Sobre as manifestações cutâneas causadas pela infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é CORRETO afirmar:

- A) O Condiloma acuminado, ou verrugas anogenitais benignas, são tipicamente causados por HPV 16 ou 18, considerados tipos de baixo risco.
- B) A Epidermodisplasia verruciforme é uma doença genética rara e crônica cujos indivíduos acometidos apresentam suscetibilidade a infecções cutâneas por tipos de HPV do gênero β , que não produzem lesões clínicas em indivíduos imunocompetentes.
- C) O Tumor de Buschke-Löwenstein apresenta comportamento localmente invasivo e destrutivo mas, apesar disso, não há risco de transformação maligna ou desenvolvimento de metástases.
- D) A Eritroplasia de Queyrat se manifesta como múltiplas pápulas ou placas confluentes, marrom-avermelhadas, localizadas na genitália externa, no períneo ou na região perianal.
- E) A Papulose Bowenoide apresenta risco de evolução para carcinoma basocelular.

30. Sobre a Neurofibromatose tipo 1 (NF1) é CORRETO afirmar:

- A) A NF1 é herdada de forma autossômica recessiva e a maioria absoluta dos pacientes possui ao menos um familiar sabidamente afetado.
- B) Diferente do que ocorre em outras genodermatoses, os pacientes com NF1 não parecem apresentar risco aumentado de desenvolver neoplasias malignas.
- C) Para que sejam consideradas critério diagnóstico da doença, as máculas café com leite devem estar presentes em número mínimo de 4 e medir mais de 5 mm, em indivíduos pré-púberes, e mais de 10 mm, em indivíduos pós-púberes.
- D) Além das manchas café com leite, também fazem parte dos critérios diagnósticos alterações como neurofibromas, efélides axilares ou inguinais, glioma óptico e nódulos de Lisch.
- E) Os sistemas afetados pela doença são o cutâneo, neurológico, oftalmológico e esquelético, com preservação dos sistemas cardiovascular e respiratório.

31. Sobre o Melasma é CORRETO afirmar:

- A) Assim como a exposição à radiação UV, o uso de alguns medicamentos, como a fenitoína, e a presença concomitante de alguns distúrbios orgânicos, como doença autoimune da tireoide, também possuem o potencial de agravar o melasma.
- B) As áreas de hiperpigmentação da face podem ser distribuídas em três padrões clássicos: centrofacial, malar e mandibular. A hiperpigmentação extrafacial, igualmente prevalente, costuma acometer mais a região extensora dos antebraços e a região dorsal superior.
- C) A localização do pigmento nas camadas da pele (epidérmico, dérmico, misto ou indeterminado) não costuma influenciar a resposta terapêutica aos diversos tratamentos.
- D) O mecanismo de ação da hidroquinona se deve exclusivamente a competir com a tirosina como um substrato para a tirosinase.
- E) Em termos de resposta terapêutica, a tretinoína tópica em monoterapia é equivalente ao tratamento combinado com hidroquinona e corticoesteróide.

32. Sobre o Xantogranuloma Juvenil é CORRETO afirmar:

- A) O xantogranuloma juvenil é a desordem histiocítica mais frequente da infância, com pico de incidência por volta dos 10 anos de idade, sendo que raramente está presente ao nascimento ou antes do primeiro ano de vida.
- B) Há predileção pelo acometimento do tronco e membros inferiores.
- C) As lesões extracutâneas já foram observadas em vários órgãos, sendo o pulmão o principal sítio afetado pela doença depois da pele.
- D) Apesar de benigno, o xantogranuloma juvenil é de difícil abordagem terapêutica. As lesões cutâneas normalmente requerem múltiplos tratamentos até a sua resolução.
- E) A denominada “associação tríplice” composta pelo xantogranuloma juvenil, pela neurofibromatose tipo 1 e pela leucemia mielomonocítica juvenil já foi observada em diversos pacientes. Estima-se que indivíduos com xantogranuloma juvenil e neurofibromatose tipo 1 tenham risco bastante aumentado para a leucemia mielomonocítica juvenil.

33. Sobre as Dermatoses Perforantes é CORRETO afirmar:

- A) A Elastose Perforante Serpiginosa é um distúrbio raro, com início na infância ou no começo da idade adulta, que ocorre frequentemente em associação a outras doenças genéticas, tais como a Síndrome de Down, a Síndrome de Marfan e o pseudoxantoma elástico.
- B) A Colagenose Perforante Reativa Familiar costuma se manifestar na idade adulta através de lesões localizadas predominantemente nos membros inferiores e caracterizadas pelo extravasamento de material necrótico.
- C) A Dermatose Perforante Adquirida é mais frequente em adultos, normalmente associada ao diabetes melito e à insuficiência hepática. Ela é a única dermatose do grupo das perforantes que não está associada a trauma ou demais situações de vulnerabilidade da pele.
- D) A Elastose Perforante Cálcaica costuma se manifestar na infância através de lesões distribuídas predominantemente nos membros inferiores e que surgem do extravasamento de fibras de colágeno calcificadas.
- E) A fototerapia não constitui uma opção terapêutica para as dermatoses perforantes.

34. Sobre o Nevo de Becker é CORRETO afirmar:

- A) Não há descrição de casos congênitos, sendo que todos os casos de Nevo de Becker até hoje relatados são lesões adquiridas ao longo da vida.
- B) É geralmente notado na primeira infância e possui predileção pelo sexo feminino, exceto na chamada “Síndrome do Nevo de Becker”, onde os homens costumam ser mais afetados.
- C) As lesões comumente apresentam uma distribuição unilateral e envolvem um quadrante superior do tronco anterior ou posterior, juntamente com o ombro. Também já foram descritas lesões na face, no pescoço, na parte inferior do tronco, nas extremidades e nas nádegas.
- D) É uma lesão de alto risco para desenvolvimento de malignidade.
- E) O tratamento do Nevo de Becker é cirúrgico na grande maioria dos casos.

35. Sobre a Cirurgia Micrográfica de Mohs é CORRETO afirmar:

- A) Consiste em uma técnica para remoção de tumores malignos da pele que combina cirurgia e patologia, sendo possível a avaliação microscópica de até 90% das margens do tecido excisado.
- B) Por ser uma técnica mais agressiva do que a cirurgia convencional, há uma menor preservação do tecido sadio perilesional, podendo requerer técnicas mais complexas de reconstrução.
- C) Não é útil para abordagem de tumores que envolvem planos de fusão embrionária, região periorbital, nervos ou estruturas ósseas.
- D) Tumores descontínuos podem criar problemas com margens falso-negativas e correspondem a uma contraindicação absoluta à técnica.
- E) A Cirurgia de Mohs com Excisão de Margens Amplas (Mohs Amplo) é uma modificação da Cirurgia de Mohs tradicional em que uma margem maior, clinicamente livre de tumor, é retirada antes ou após a avaliação da margem histológica de Mohs. Esta técnica é utilizada para os tumores com grandes riscos de recorrência ou metástase, como o melanoma e o carcinoma de células de Merkel.

36. Sobre quadros infecciosos bacterianos na dermatologia é CORRETO afirmar:

- A) O diagnóstico da queratólise plantar sulcada é normalmente clínico. Quando examinada sob a lâmpada de Wood, ela apresenta uma fluorescência azulada típica que pode auxiliar no diagnóstico diferencial com outras dermatoses infecciosas plantares.
- B) O Eritrasma interdigital é a infecção bacteriana mais comum dos pés e também a forma mais frequente de eritrasma. Apresenta-se como uma maceração crônica e assintomática, com fissuras interdigitais.
- C) O Erisipeloide é uma infecção cutânea aguda causada pela inoculação traumática do *Erysipelothrix rhusiopathiae*, sendo mais frequentemente observada em criadores de ovinos e caprinos.
- D) A doença perianal causada por estreptococos do grupo A se apresenta como um eritema nitidamente demarcado e vermelho vivo, que se estende por 2-3 cm da borda anal. A faixa etária mais frequentemente afetada é a adulta.
- E) A Síndrome dos Pés Quentes é causada por bactérias do gênero *Corynebacterium*.

37. Sobre as Micoses Superficiais é CORRETO afirmar:

- A) A Piedra é uma infecção superficial da haste do cabelo onde os elementos fúngicos se unem para formar nódulos ou "pedras". As duas formas principais, piedra preta e piedra branca são indistinguíveis clínica ou microscopicamente.
- B) A Tinea nigra se apresenta como uma mácula ou placa única, bem delimitada, de coloração que varia de marrom ao cinza ou esverdeada e acomete exclusivamente a região palmar.
- C) O Granuloma de Majocchi é uma dermatofitose causada pelo fungo antropofílico *T. concentricum* e cuja apresentação clínica consiste em anéis concêntricos que lembram o *erythema gyratum repens*.
- D) As infecções cutâneas por *Candida* se apresentam normalmente como placas de eritema leve, associadas à descamação. O quadro clínico é brando e não se observa a presença de erosões, pápulas ou pústulas. As zonas intertriginosas costumam ser poupadas.
- E) A *tinea pedis* tipo mocassim está frequentemente presente em pacientes com *tinea manuum* e ambas as entidades apresentam características clínicas comuns, tais como a cronicidade e a hiperqueratose.

38. Os enterovírus, subgrupo da família picornavírus, causam uma grande variedade de afecções clínicas associadas aos exantemas. Sobre as enteroviroses, é CORRETO afirmar:

- A) As infecções enterovirais são normalmente transmitidas entre humanos pelas vias fecal-oral e respiratória. Em locais de clima temperado, observa-se um aumento na incidência das infecções durante os meses de inverno e primavera.
- B) Em virtude do pequeno número de sorotipos diferentes de enterovírus, o diagnóstico sorológico é de fácil realização e de grande aplicabilidade clínica.
- C) Além das apresentações características de Doença mão-pé-boca e herpangina, os enterovírus podem provocar um espectro diverso de exantemas que podem ser morbiliformes, rubeoliformes, urticariformes, escarlatiniformes, vesiculares, pustulares e petequiais.
- D) A taxa de complicações graves e potencialmente fatais relacionada às enteroviroses é elevada, mesmo em indivíduos imunocompetentes.
- E) O conteúdo das vesículas na doença mão-pé-boca é estéril, não havendo possibilidade de detectar o vírus através de exame do mesmo. Por esta mesma razão, também não há risco de transmissão viral a partir do contato com as vesículas.

39. Em relação às técnicas histoquímicas mais comumente empregadas em dermatopatologia, assinale a associação INCORRETA:

- A) Vermelho Congo - amiloidose
- B) Fontana- Masson - avaliação do vitiligo
- C) Giemsa - leishmaniose e histoplasiose
- D) Azul da Prússia - infecções micobacterianas
- E) Azul de toluidina - mastocitose

40. Sobre as doenças psicocutâneas, assinale a CORRETA:

- A) Nos delírios de parasitoses o paciente está totalmente convicto de que uma crença falsa é verdadeira.
- B) Os delírios de parasitoses podem decorrer diretamente do efeito de uma droga ou medicamento.
- C) O transtorno dismórfico-corporal em geral começa na vida adulta e não está associado com comportamentos compulsivos ou rituais.
- D) Uma pista diagnóstica para a dermatite artefacta é a presença de lesões em vários estágios evolutivos: de pequenas erosões superficiais a ulcerações profundas com cicatrizes hipo e hiperpigmentadas.
- E) O pico de surgimento da tricotilomania está na vida adulta e deve-se considerar nos diagnósticos diferenciais outras causas de alopecia cicatricial.

41. Em relação à psoríase, assinale a INCORRETA:

- A) As formas não pustulosas de psoríase têm sido classificadas em dois tipos: a psoríase tipo 1, de início precoce (antes dos 40 anos), com história familiar positiva e associação com HLA Cw6 e HLA DR7; e a tipo 2, de início tardio (após os 40 anos), com história familiar negativa e sem associação marcante com HLA.
- B) Sua fisiopatologia não está completamente elucidada, sendo classificada como doença autoimune. O papel de mecanismos imunes é documentado pela presença de linfócitos T ativados e macrófagos, bem como pela boa resposta a terapias imunossupressoras.
- C) A predisposição genética é um fator relevante na psoríase. A herança é poligênica com risco de cerca de 20 vezes maior para parentes de primeiro grau. Os marcadores identificados até o momento estão associados aos antígenos leucocitários HLA Cw6, B14, Bw57, DR8 e B28.
- D) O curso da psoríase é recidivante, e os fatores desencadeantes podem ser o clima frio, infecções (estreptococo, HIV), estresse e fármacos (bloqueadores adrenérgicos, antimaláricos, lítio, inibidores da enzima conversora de angiotensina, sais de ouro, interferona alfa, corticosteroides sistêmicos e anti-inflamatórios não esteroides), entre outros.
- E) Há uma série de comorbidades associadas à psoríase, entre elas alcoolismo, depressão, obesidade, diabete melito, hipertensão arterial, síndrome plurimetabólica, colite e artrite reumatoide. Além disso, pacientes com psoríase possuem um risco aumentado, embora pequeno, para o desenvolvimento de câncer, principalmente câncer de pele não melanoma, linfoma e câncer de pulmão.

42. Em relação à terapêutica da psoríase, levando em conta o PCDT, assinale a CORRETA:

- A) Hipocalcemia é contra-indicação absoluta para uso de calcipotriol.
- B) A ciclosporina é teratogênica e pode aumentar o risco de complicações na gravidez como prematuridade, baixo peso ao nascimento e pré-eclâmpsia. Sua classificação no FDA é categoria D e, portanto, não deve ser considerada como terapêutica em gestante com psoríase grave.
- C) Os medicamentos biológicos podem predispor à ativação de tuberculose latente e levar ao desenvolvimento de formas graves de tuberculose e culminar com o óbito. Este risco, de reativação de tuberculose, é maior com os anti-TNF, principalmente no caso dos anticorpos monoclonais (como Secuquinumabe e Ustequinumabe).
- D) Nos casos pediátricos de psoríase grave, existem evidências de que acitretina, metotrexato e ciclosporina podem ser usados como fármacos de primeira linha com boa eficácia e baixa incidência de efeitos adversos.
- E) Os dois principais efeitos adversos do metotrexato são a mielossupressão e a hepatotoxicidade, ambos ocorrendo nas primeiras semanas de uso do medicamento.

43. São consideradas opções terapêuticas para a acne vulgar, EXCETO:

- A) peróxido de benzoíla
- B) mupirocina
- C) dapsona
- D) eritromicina oral
- E) contraceptivos orais

44. Considere o quadro clínico a seguir e assinale a CORRETA.

Masculino, 45 anos, apresentando placas vermelho-alaranjadas com ilhas de pele sã que se iniciaram na cabeça e foram progredindo para direção caudal, além de queratodermia palmo-plantar.

- A) O principal diagnóstico é a doença de Darier, uma genodermatose autossômica dominante.
- B) O principal diagnóstico é pitiríase rubra pilar tipo I (ou clássica do adulto), subtipo mais comum e apresenta curso crônico.
- C) O principal diagnóstico é pitiríase rubra pilar tipo II (atípico do adulto), sendo que a maioria entra em remissão em 3 anos.
- D) Pode acometer as unhas, causando manchas de óleo e *pitting*, assim como na psoríase, um importante diagnóstico diferencial.
- E) Histologicamente, existem paraqueratose e ortoqueratose alternando-se vertical e horizontalmente.

45. Sobre eritrodermia assinala a CORRETA:

- A) É definida como eritema e descamação envolvendo mais do que 50% da superfície da pele.
- B) Em adultos, as causas mais comuns são ictioses e farmacodermia.
- C) Em adultos, linfoma cutâneo de células T é uma causa menos comum e indícios clínicos são prurido intenso, coloração violácea-vermelha profunda, alopecia e fácies leonina.
- D) A manifestação extracutânea mais frequente em pacientes eritrodérmicos é a hepatomegalia.
- E) Medicamentos que comumente causam eritrodermia são corticosteróides e codeína.

46. Assinale a alternativa CORRETA sobre doenças eczematosas:

- A) A forma infantil da dermatite seborréica é crônica, surgindo em geral após os 3 meses de idade.
- B) As mulheres são mais frequentemente acometidas pela dermatite seborréica do que homens.
- C) A dermatite de estase é uma das causas mais frequentes de eczema disseminado (autossensibilização).
- D) O eczema disidrótico é causado por alteração das glândulas sudoríparas.
- E) A dermatite infecciosa é um distúrbio dermatológico comum e uma característica clínica é a baixa resposta aos antibióticos.

47. Na análise de padrões dermatoscópico, qual dos abaixo NÃO indica lesão melanocítica:

- A) rede pigmentar
- B) estrias
- C) glóbulos agrupados
- D) pigmentação azul homogênea
- E) vasos arbóreos

48. Sobre hemangioma da infância, assinale a alternativa que melhor aborda os subtipos com indicação de tratamento sistêmico com propranolol:

- A) hemangioma profundo segmentar na perna, hemangioma misto de 3cm em lábio inferior, hemangioma superficial 1,3cm em malar.
- B) hemangioma misto 2,8cm na região interglútea, hemangioma misto de 2cm em tórax, hemangioma superficial 3cm em coxa.
- C) hemangioma misto 1,5cm em pálpebra superior, hemangioma misto segmentar coxa, hemangiomatose múltipla.
- D) hemangiomatose múltipla, hemangioma congênito evoluindo para síndrome de Kasabach-Merritt, hemangioma misto segmentar em face.
- E) hemangioma misto segmentar em face, hemangioma congênito evoluindo para síndrome de Kasabach-Merritt, hemangioma superficial 1,5cm em dorso.

49. Sobre síndrome de Sweet, assinale a correta:

- A) As manifestações sistêmicas mais comuns incluem febre e artralgias.
- B) Clinicamente caracteriza-se por pústulas, úlceras orais e genitais.
- C) Frequentemente a lesão inicial é uma pústula sobre base eritematosa ou uma bolha.
- D) Excelente resposta a corticosteróides sistêmicos não faz parte dos critérios diagnósticos.
- E) As condições associadas incluem infecção, malignidades, doenças auto-imunes e gravidez.

50. Considere o caso clínico a seguir e assinale a CORRETA:

Masculino, 40 anos, maratonista. Refere bolinhas nos calcanhares ao ficar de pé, assintomáticas. Ao exame físico apresentava nódulos amarelados, múltiplos na face lateral dos calcanhares quando em ortostatismo.

- A) O diagnóstico mais provável é calosidade e o uso de sapatos adequados é uma das formas de prevenção.
- B) O diagnóstico mais provável é pé de tenista e o tratamento é remoção cirúrgica.
- C) O diagnóstico mais provável é pápula piezogênica e o tratamento é remoção cirúrgica.
- D) O diagnóstico mais provável é pápula piezogênica e a causa são herniações da gordura subcutânea da fáscia plantar.
- E) O diagnóstico mais provável é pápula piezogênica e o uso de sapatos adequados é uma forma de prevenção eficaz.

51. Sobre doenças císticas, assinale a CORRETA:

- A) Os cistos epidérmicos são os cistos cutâneos mais comuns e múltiplos cistos podem estar presentes na síndrome de Cowden.
- B) Assim como o cisto epidérmico, o cisto triquelema tem parede cística com camada granulosa.
- C) Os cistos triquelemais podem ser herdados como um traço autossômico dominante.
- D) Os cistos vellus eruptivo ocorrem predominantemente no abdômen e têm herança autossômica recessiva.
- E) Os esteatocitomas são mais numerosos no dorso e face.

52. Sobre lesões melanocíticas acrais e dermatoscopia, assinale a CORRETA:

- A) O padrão paralelo é encontrado na pele glabra e, mais raramente, também na face.
- B) O padrão em treliça é específico de nevos acrais congênitos.
- C) Quando a pigmentação está localizada nos sulcos, as linhas pigmentadas são mais espessas do que as não pigmentadas.
- D) Vários pontos esbranquiçados semelhante ao colar de pérolas é específico de melanoma acral.
- E) O padrão de cristas paralelas é sugestivo de melanoma em locais acrais.

53. No manejo de úlceras genitais, conforme o Ministério da Saúde, assinale a CORRETA:

- A) Para não violar o sigilo médico, não se deve oferecer tratamento para as parcerias sexuais.
- B) Caso haja histórico de lesões vesiculosas, deve-se tratar além de herpes genital, sífilis e donovanose.
- C) Na presença de úlcera genital com menos de 4 semanas de evolução sem evidência de lesões vesiculosas, deve-se tratar sífilis e cancróide.
- D) O tratamento de primeira escolha para cancróide é com ciprofloxacino 500mg, 2x ao dia por 3 dias.
- E) A coleta de material para microscopia (Gram e Giemsa) é mandatória.

54. Assinale a correta em relação ao vitiligo:

- A) O vitiligo segmentar responde melhor à terapêutica não cirúrgica do que o vitiligo não segmentar.
- B) O tratamento combinado de corticoterapia tópica e fototerapia é indicado em todos os casos de vitiligo inicial.
- C) O uso de inibidores de calcineurina deve ser limitado a 8 semanas.
- D) Fototerapia é contra-indicada na gestação devido ao risco de diminuição do ácido fólico sérico.
- E) Em crianças maiores do que 2 anos com vitiligo em face, pescoço e áreas intertriginosas, o uso tópico dos inibidores da calcineurina deve ser preferido, em razão de sua eficácia e do melhor perfil de segurança.

55. São princípios fundamentais do médico, conforme o Código de Ética Médica, EXCETO:

- A) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza.
- B) A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza.
- C) O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.
- D) Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.
- E) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.

56. O desenvolvimento de linhas de cuidado para pessoas com risco ou com o diagnóstico de determinadas doenças possibilita a contemplação de quais princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde:

- A) Equidade e universalidade.
- B) Gratuidade e planejamento.
- C) Integralidade e equidade.
- D) Planejamento e humanização.
- E) Universalidade e integridade.

57. Sobre a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), considere as afirmativas abaixo:

- I - O acolhimento refere-se ao Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- II - O acolhimento refere-se à organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho.
- III - Por clínica ampliada, entende-se a prática interdisciplinar com a proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida propõe qualificar o modo de se fazer saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e III.
- E) Todas estão corretas.

58. Segundo Barbara Starfield, os princípios da atenção primária à saúde (APS) são classificados em atributos essenciais e atributos derivados. Considere as afirmativas abaixo:

- I - O acesso de primeiro contato, a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação da atenção são atributos essenciais.
- II - A orientação familiar pressupõe que a atenção à saúde seja regular e continuada com seguimento ao longo do tempo.
- III - A coordenação da atenção articula o fluxo entre os diferentes pontos da rede de atenção à saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a I e III.

59. O(a) _____ é uma forma de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam propostas de intervenção pedagógico-terapêutica.

Para que o trecho esteja correto, a lacuna deve ser preenchida por:

- A) coordenação
- B) matriciamento
- C) referenciamento
- D) co-gestão
- E) descentralização

60. Sobre medicina baseada em evidências (M.B.E.), considere:

- I - Nível de evidência A corresponde principalmente a ensaios clínicos randomizados, com controles adequados.
- II - O sistema GRADE define a forma clara e objetiva o grau de recomendação para se adotar uma determinada conduta, podendo ser forte (1) ou fraco (2).
- III - Uma evidência com nível C indica forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Todas estão corretas.

RASCUNHO